

## PAASTUMIST NÕUDVAD ANALÜÜSID

### Enne loetletud analüüside andmist ei tohi süüa ega juua 10–12 tundi

<b>fS-ACE</b>	Angiotensiini muundav ensüüm paastuseerumis
<b>fP-Fol</b>	Folaat
<b>Fp-Vit B12</b>	Vitamiin B12
<b>fP-Gluc</b>	Glükoos
<b>fS-P1NP</b>	I tüüpi prokollageeni N-fragment
<b>fP-Trig</b>	Tigütseriidid
<b>fS-CTx</b>	I tüüpi kollageeni C-telopeptiidi beetaisomeer
<b>fS-Osetoca</b>	Osteokaltsiin
<b>fP-C-pept</b>	C-peptiid
<b>GTT</b> (fP-Gluc 0 min, , P-Gluc, 120 min, P-Gluc 60 min*)	Glükoosi taluvuse proov
<b>Lac-TT</b> (fP-Gluc 0 min, P-Gluc 20min, P-Gluc 40 min, P-Gluc 60 min)	Laktoosi taluvuse proov

\*ainult rasedatel

### Enne loetletud analüüside andmist on soovitatav paastuda 10-12 tundi

<b>P-Zn</b>	Tsink
<b>P-Crea</b>	Kreatiniin
<b>P-Lip</b>	Lipaas
<b>P-P</b>	Fosfaat
<b>P-apoA1, P-apoB</b>	Apolipoproteiin A,B
<b>P-RF</b>	Reumatoidfaktor
<b>P-Lp(a)</b>	Lipoproteiin a
<b>S-ALP-isoE</b>	Aluselise fosfataasi isoensüümid
<b>Sal-Cort (hommik)</b>	Kortisool süljes pärast öist paastu kl 6.00-10.00
<b>Sal-Cort (kesköö)</b>	Kortisool süljes kl 23.00-24.00

Jane Kurm  
Laboratooriumi juhtiv bioanalüütik  
617 1162