



NAHABIOPSIA

Nahabiopsia ehk koeproov on protseduur, mille käigus võetakse nahast proovitükk. Proovitükk saadetakse koe- ehk histoloogilisele uuringule nahamuutuse korral diagnoosi täpsustamiseks.

Protseduuri ajal:

- biopsia võtmise koht tuimastatakse süstiga;
- arst asetab nahale biopsiapuuri ja lõikab pöörlevate liigutustega nahast välja 2–6 millimeetrise läbimõõduga ümara proovitüki;
- suurema proovitüki võtmisel õmmeldakse haav kinni;
- proovitüki võtmise kohale asetatakse plaaster.

Protseduuri järgselt:

- jätke plaaster nahale 24 tunniks;
- ärge tehke proovitüki võtmise kohta 48 tunni jooksul märjaks;
- paar päeva pärast protseduuri võite biopsia piirkonnas tunda vähest valu ning esineda võib vähest veritsust.

Võimalikud tüsistused ja ohud

Üksikutel juhtudel võib tekkida verejooks või infektsioon. Selle vältimiseks hoidke biopsia võtmise koht kuiva ja puhtana.

Võtke ühendust arstiga, kui:

- proovitüki võtmise kohas tekib tugev punetus, turse või valulikkus;
- kehatemperatuur tõuseb üle 38°C;
- tekib pidev veritsus või eritub mäda.