

Laboratoorium

Molekulaardiagnostika labor

Tel 617 1769; 617 1026 (preanalüütika)

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn

Saatja asutus .....

Osakond .....

Arst/kood .....

Telefon .....

PATSIENT

Nimi .....

Isikukood .....

Hgl nr .....

Proovi võtmise kuupäev .....

Proovi võtmise kellaeg .....

Proovivõtja .....

Diagnoos .....

**H. PYLORI JA KLARITROMÜTSIIN-TUNDLIKKUSE MOLEKULAARDIAGNOSTILINE UURING**

**Biopsiamaterjal** steriilne lisandita proovinõu (punane kork)

Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel

*Helicobacter pylori* DNA

*Helicobacter pylori* resistentsusmutatsioonid klaritromütsiini suhtes

**Lisainfo:** Proovimaterjal võtta NaCl 0.9% niisutatud marlilapi vahele. Võimalusel võtta biopsiamaterjal kahest paikmest (antrum ja korpus), mis tuleb panna eraldi proovinõusse. Proovinõul peab olema selgelt märgitud materjali lokalisatsioon (antrum või korpus).

Laboratoorium

Molekulaardiagnostika labor

Tel 617 1769; 617 1026 (preanalüütika)

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn

Saatja asutus .....

Osakond .....

Arst/kood .....

Telefon .....

PATSIENT

Nimi .....

Isikukood .....

Hgl nr .....

Proovi võtmise kuupäev .....

Proovi võtmise kellaeg .....

Proovivõtja .....

Diagnoos .....

**H. PYLORI JA KLARITROMÜTSIIN-TUNDLIKKUSE MOLEKULAARDIAGNOSTILINE UURING**

**Biopsiamaterjal** steriilne lisandita proovinõu (punane kork)

Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel

*Helicobacter pylori* DNA

*Helicobacter pylori* resistentsusmutatsioonid klaritromütsiini suhtes

**Lisainfo:** Proovimaterjal võtta NaCl 0.9% niisutatud marlilapi vahele. Võimalusel võtta biopsiamaterjal kahest paikmest (antrum ja korpus), mis tuleb panna eraldi proovinõusse. Proovinõul peab olema selgelt märgitud materjali lokalisatsioon (antrum või korpus).